

# Application Rationnelle du Traitement de Whipple aux malades les plus susceptibles

## HEPATROL

### EN AMPOULES BUVABLES

### d'une grande facilité d'absorption



DÉFINITION. — L'Hépatrol est un **EXTRAIT DE FOIE VITAMINÉ** délipoidé et déprotéiné renfermant sous un petit volume la totalité du principe antianémique du Foie tel que :

15 à 16 Grs = 1000 Grs de foie frais

PRÉSENTATION. — L'Hépatrol est présenté en ampoules buvables afin d'en assurer la bonne conservation sous tous les climats.

DOSAGE. — Chaque ampoule de 10 cc. contient 2 Grs d'extrait et correspond à 125 Grs de Foie.

MODE D'EMPLOI. — Une à trois ampoules par jour suivant avis du médecin et selon le degré d'anémie.

A prendre dans une tasse de bouillon de légumes non salé, dans un peu de vin sucré, ou dans tout autre liquide suivant le goût du malade et l'avis du médecin. Pour les enfants une ampoule en un ou deux jours et en une ou plusieurs fois dans la journée.

RÉSULTATS. — D'après les observations qu'il nous a été donné de recueillir dans les divers services hospitaliers où s'est effectuée notre expérimentation, nous avons pu constater au bout de 4 à 8 jours de traitement une amélioration très marquée de l'état général de tous les malades traités.

La numération globulaire effectuée dans des conditions de précision rigoureuse est toujours venue confirmer les améliorations constatées.

REMARQUE. — Nous conseillons de poursuivre le traitement jusqu'à ce que la formule sanguine se trouve normalisée, c'est-à-dire environ 5 à 6 semaines.

A ce moment une ration d'entretien d'une ampoule tous les deux jours, suffit à maintenir le résultat acquis.

INDICATIONS. — ANÉMIES GRAVES (Anémie pernicieuse....).  
ANÉMIES SECONDAIRES (Tuberculose-Endocardite-Néphrite)  
ANÉMIES CONSÉCUTIVES aux interventions chirurgicales.  
» » au traitement radiothérapique.

En un mot toutes les fois que la formule globulaire est en déficience.

(Notice et Conditionnement provisoires)